

IMPFKALENDER

Stand: Juli 2007
Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Empfohlenes Impfalter	Geburt	Alter in Monaten				Alter in Jahren				
		2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-17	ab 18	ab 60
Wundstarrkrampf (Tetanus)		1.	2.	3.	4.		A	A	A ^{b)}	
Diphtherie		1.	2.	3.	4.		A	A	A ^{b)}	
Keuchhusten (Pertussis)		1.	2.	3.	4.		A	A		
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)		1.	2. ^{a)}	3.	4.					
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		1.	2. ^{a)}	3.	4.			A		
Hepatitis B		1.	2. ^{a)}	3.	4.			G		
Pneumokokken		1.	2.	3.	4.				S	
Meningokokken							1. ^{c)}			
Masern, Mumps, Röteln (MMR)						1.	2.			
Windpocken (Varizellen)						1.	2. ^{d)}	e)		
Humane Papillomviren (HPV)								f)		
Influenza									S ^{g)}	



A Auffrischimpfung S Standardimpfung

G Grundimmunisierung für alle Jugendlichen, die bisher nicht geimpft wurden bzw. Komplettierung eines noch unvollständigen Impfschutzes.

a) Bei Einzelimpfstoffen und Impfstoffen ohne Pertussisantil kann diese Dosis entfallen.

b) Auffrischimpfung alle 10 Jahre c) Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat

d) Bei Verwendung eines MMR-Varizellenimpfstoffes Gabe einer 2. Dosis

e) Impfung von Jugendlichen ohne Windpockenerkrankung oder -impfung

f) Für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren g) Jährlich mit aktuellem Impfstoff

Ziel muss es sein, möglichst frühzeitig einen vollständigen Impfschutz zu erreichen. Abweichungen von den angegebenen Terminen sind möglich und unter Umständen notwendig.

